

9. Autoevaluación

Pág. 1 de 4

1. ¿Resuelves problemas de probabilidad de experiencias compuestas?					
1	En una baraja española (40 cartas, 4 palos: OROS, ESPADAS, COPAS, BASTOS), consideremos los siguientes sucesos:				
	B = BASTOS				
	F = FIGURAS (sotas, caballos, reyes)				
	R = REYES				
	A = ASES				
	a) Describe los siguientes sucesos: $B \cap F$, $B \cup R$, $R \cup A$, $R \cap A$ diciendo de qué cartas consta cada uno de ellos.				
	b) Calcula las probabilidades de los cuatro sucesos anteriores.				
	c) Describe el suceso $(F \cup A)'$ y calcula su probabilidad.				

 \bigstar Mira la página 222 de tu libro de texto.



9. Autoevaluación

Pág. 2 de 4

- 2 Lanzamos una moneda cuatro veces y anotamos los resultados en orden. Por ejemplo (C, +, C, C). Describe los sucesos:
 - A = El primer lanzamiento ha sido cara
 - B = Ha habido, al menos, dos caras
 - $A \cap B$
 - A'
 - B'

Calcula la probabilidad de cada uno de los cinco sucesos anteriores.

- ★ Mira la página 222 de tu libro de texto.
- 3 Lanzamos tres dados. ¿Cuál es la probabilidad de que el menor de los resultados sea 5?


★ Mira la página 222 de tu libro de texto.





9. Autoevaluación

Pág. 3 de 4

4 Tenemos tres urnas con bolas rojas y verdes:







- a) Sacamos una bola de cada urna. Hallar la probabilidad de que las tres sean rojas.
- b) Se saca una bola de A y se echa en B. Removemos. Se saca una bola de B y se echa en C. Removemos. Se saca una bola de C. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres bolas extraídas sean rojas?

- ★ Mira la página 223 de tu libro de texto.
- 5 a) Sacamos tres cartas de una baraja (de 40 cartas). Calcular la probabilidad de que las tres sean figuras.
 - b) Tenemos tres barajas de 40 cartas. Sacamos una carta de cada baraja. Hallar la probabilidad de que las tres sean figuras.



9. Autoevaluación

Pág. 4 de 4

6 Queremos romper un botijo viejo a pedradas. Tenemos tres piedras y la probabilidad de acertar con cada una de ellas es 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de romper el botijo con alguna de las tres?

(INDICACIÓN: calcula, previamente, la probabilidad de no acertar con ninguna).

★ Mira la página 223 de tu libro de texto.

II. ;Intepretas las tablas de contingencia? ;Resuelves problemas de probabilidad relacionados con ellas?

7 Se ha estudiado el caso de 500 personas adultas durante un invierno, teniendo en cuenta si fuman (F) o no (no F), y si se han resfriado (R) o no (no R). Estos son los resultados:

	F	no F	TOTAL
R	140		
no R		150	
TOTAL	200		500

- a) Completa la tabla.
- b) Explica el significado de F/R y calcula su probabilidad.
- c) Explica el significado de R/F y calcula su probabilidad.
- d) ¿Se infiere de estos resultados que los fumadores son más propensos a los resfriados?