

DERMATOFITOSIS

Índice

- Origen y tipos
- Síntomas y signos
- Vía de transmisión
- Tratamiento



ORIGEN

- La dermatofitosis, llamada comúnmente tiña, es una enfermedad cutánea contagiosa, producida por hongos dermatofitos, parasitarios de los géneros *Microsporum* y *Trichophyton*.
- TIPOS DE INFECCIÓN
- Infección del cuero cabelludo.
- Infección del tronco y extremidades.
- Infección en la ingle.
- Infección de las palmas.
- Infección de la barba y el área del cuello.
- Infección de la cara.
- Infección de la uñas.

SINTOMAS Y SIGNOS

- Lesiones (llagas) que producen picor (a veces).
- En el cuero cabelludo las lesiones causan pérdida de pelo en pequeñas áreas y descamación del cuero cabelludo.
- En la piel del cuerpo las lesiones son rojas, circulares y aplanadas.
- En la zona de la barba las lesiones causan una erupción con comezón que se descama debajo de la barba.
- En los pies la piel entre los dedos, una erupción molesta que pica y que se descama.
- Las uñas se vuelven gruesas, amarillentas y sin brillo, con costras en el extremo libre.

VIA DE TRANSMISIÓN

- Es muy contagiosa, y se transmite por contacto directo y a través de zapatos, calcetines, toallas, duchas y piscinas. La susceptibilidad a la infección está aumentada en situaciones de poca higiene, calzado oclusivo, humedad y lesiones de la piel o las uñas.



TRATAMIENTO

- Fármacos que se usan:
- Sistemáticos: Griseofulvina
- Ketakonazol: Terbinafina, Itraconazol y Fluconazol.
- Tópicos: Imidazólicos

